

核准日期：2007年04月26日

修改日期：2010年12月29日

神威®

灯盏花素注射液说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

- 【药品名称】** 通用名称：灯盏花素注射液
汉语拼音：Dengzhanhuasu Zhushuye
- 【成份】** 本品为灯盏花素的灭菌水溶液。辅料为依地酸二钠、甘油、碳酸氢钠。
- 【性状】** 本品为黄色的澄明液体。
- 【功能主治】** 活血化瘀，通络止痛。用于中风后遗症，冠心病，心绞痛。
- 【规格】** 5ml:20mg
- 【用法用量】** 肌内注射，一次5mg，一日2次。静脉滴注，一次10-20mg，用500ml 10%葡萄糖注射液稀释后使用，一日1次。
- 【不良反应】** 据文献报道，本品不良反应如下：
1. 发生率低，多为个例报道。偶见寒战、高热、全身发痒、皮疹、乏力、心悸、胸闷、气短、头晕、头痛、恶心、支气管哮喘、喉头水肿等症状；罕见局部皮肤瘙痒。
2. 罕见过敏性休克、上消化道出血、肝功能异常等严重不良反应。
- 【禁忌】** (1) 脑出血急性期或有出血倾向的患者禁用。
(2) 对本品有过敏反应或严重不良反应病史者禁用。过敏体质者禁用。
(3) 新生儿、婴幼儿禁用。
(4) 孕妇禁用。
- 【注意事项】** 1. 本品适宜单独使用，不能与其他药物在同一容器中混合使用。谨慎联合用药，如确需联合使用其他药品时，应谨慎考虑与灯盏花素注射液的间隔时间以及药物相互作用等问题。
2. 心痛剧烈及持续时间长者，应作心电图及心肌酶学检查，并采取相应的医疗措施。
3. 本品不能与氨基糖苷类、喹诺酮类、头孢菌素类、青霉素类、氯霉素类、去甲肾上腺素、间羟胺、肾上腺素、多巴胺、山莨菪碱、阿托品、纳洛酮、氨茶碱、川芎嗪、低分子右旋糖酐、脑蛋白水解物、甘露醇、普鲁卡因、硫酸镁、碳酸氢钠、速尿、果糖注射液、甲硝唑、阿莫西林维酸钾、呋塞米、丙酯氯化钠注射液联合用药。本品与西药抗休克血管活性药物及抗胆碱药物存在明显的配伍禁忌。禁止与抗生素联合使用，尤其不能与青霉素类高

敏类药物合并使用。

4. 本品是纯中药制剂，保存不当可能影响产品质量。发现药液出现浑浊、沉淀、变色或瓶身有漏气、裂纹等现象时不能使用。如经葡萄糖注射液稀释后出现浑浊、沉淀、变色亦不得使用。

5. 务必加强全程用药监护和安全性监测，密切观察用药反应，特别是开始30分钟。发现异常，立即停药。

6. 哺乳期妇女、有消化道疾病患者，请谨慎使用。消化道疾病患者在使用期间还要注意监测患者肝功能，谨防出现肝损害。儿童用药应严格按公斤体重计算。

7. 对老人、儿童、心脏严重疾患、肝肾功能异常患者等特殊人群和初次使用的患者应慎重使用。如确需使用，应减量或遵医嘱。

8. 静脉滴注时，必须稀释以后使用。严格控制滴注速度和用药剂量。建议滴速小于40滴/分，一般控制在15~30滴/分。首次用药，宜选用小剂量，慢速滴注。

9. 除按【用法用量】使用外，还可用0.9%氯化钠注射液配伍使用，且应现配现用。用药前，详细询问患者有无过敏史。

10. 禁止使用静脉推注的方法给药。

11. 临床用药时，建议根据患者年龄、病情、体征等从低剂量开始，缓慢滴入，1个疗程不宜大于2周，坚持中病即止，防止长期用药。对长期使用的在每疗程间要有一定的时间间隔。

12. 不良反应不一定发生在早期，可能会出现迟发性变态反应。

【药物相互作用】尚无本品与其他药物相互作用的信息。

【贮藏】避光，密封。

【包装】安瓿装，每盒5支。

【有效期】36个月

【执行标准】部颁标准中药成方制剂第二十册WS₃-B-3822-98

【批准文号】国药准字Z13020778

【生产企业】

企业名称：神威药业有限公司

生产地址：河北省石家庄栾城

邮政编码：051430

电话号码：(0311)88030066

传真号码：(0311)88030088

注册地址：河北省石家庄市栾城县城南口

网 址：<http://www.shineway.com>

售后服务电话：8008039208 4006129208

电子邮件：info@shineway.com

